

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-5-4-8803199



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°

du

30 Mars 1988

117

VIGNE ====

** Excoriose

Des traitements de printemps permettent de lutter contre l'excoriose.



D

Sortie des feuilles

Apparition des feuilles rudimentaires rassemblées en rosette, dont la base est encore protégée par la « bourre », progressivement rejetée hors des écailles.



E

Feuilles étalées

Premières feuilles totalement dégagées présentant les caractères variétaux. Sarcot herbacé nettement visible.

--> Si vous utilisez des fongicides de contact (dichlofluanide, dithianon, folpel, mancozèbe, metirame de zinc, propinèbe, soufre, folpel + captafol, folpel + mancozèbe, folpel + penconazole) ou des produits à base de cymoxanil, effectuez deux traitements.

-- Le premier, lorsque 30 à 40 % des bourgeons ont atteint le stade D.

-- Le deuxième, lorsque 40 % des bourgeons sont au stade E.

--> Si vous utilisez des fongicides à base de phosethyl - al (MIKAL, RHODAX), effectuez un traitement lorsque les premiers bourgeons atteignent le stade D. Ne réalisez une deuxième application lorsque les bourgeons atteignent le stade E que si le débourrement est échelonné.

P. 36

ARBRES FRUITIERS

=====

Après l'étalement des feuilles, les périodes de contamination pour la cloque sont terminées. Préoccupez-vous des **acariens**, si vos parcelles ont subi des attaques l'an passé, c'est le début d'éclosion des oeufs.

--> Vous pouvez agir sur les **oeufs** dès maintenant.
(APOLLO 50 SC et CESAR ne doivent être appliqués qu'une seule fois dans l'année, ou l'un, ou l'autre.)

--> Attendez encore pour intervenir sur les larves = observez les sorties à la loupe.

-- Le tableau joint vous permettra de faire le point sur les différents produits. (Attention pour l'APOLLO 50 et le SC CESAR).

COLZA

=====

** Méligethes

Les colzas sont parvenus au stade D " boutons accolés " et stade E " boutons écartés ".

- Période sensible pour les attaques de méligethes (insectes qui rongent les inflorescences.)


- Le seuil d'intervention se situe :

- A 1 insecte par inflorescence au stade D.
- 2 ou 3 insectes par inflorescence au stade E.

Le traitement est inutile à la floraison.



Boutons écartés (E)



Meligethes

ARBRES FRUITIERS : ACARICIDES SPÉCIFIQUES HOMOLOGUÉS OU EN AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose spécialité/ha (1 000 l/ha)	Efficacité				Délais d'emploi avant récolte (en jours)	Observations
			œufs		larves	adultes		
			hiver	été				

PRODUITS ACTIFS SUR ADULTES, LARVES, CERTAINS SUR ŒUFS

chinométhionate	Morestan	0,5 kg	○	●	●	●	Sans délai	Favorise parfois la rugosité sur Golden. Risque de phytotoxicité au printemps sur Golden et sur poirier Williams. Efficace sur oïdium.
cyhexatin + clofentezine	Gladiator Apollo PL	1 l 0,8 l	○	●	●	●	45	
cyhexatin + tétradifon	Nombreuses	300 g + 160 g m.a.	○	●	●	●	30	
dicofol + tétradifon	Kelthion	2 l	○	●	●	●	15	Utiliser hors période de sensibilité à la rugosité.
amitrazé	Maïtac 20 Tudy	3 l	○	●	●	●	30	Efficace sur psylles.
benzoximate	Artaban	1,5 l	○	●	●	●	15	Action progressive.
binapacryl	Ambox 50 Endosan	1 kg 1,25 l	○	●	●	●	21	Efficace si température > 15°. Actif sur oïdium.
bromopropylate	Néoron	2 l	○	●	●	●	15	Utiliser de préférence en traitement précoce. Sur prunes, n'utiliser que sur variétés bleues. Action progressive.
dicofol	Nombreuses	500 g m.a.	○	●	●	●	15	
azocyclotin	Péropal	1,2 kg	○	○	●	●	30	
biphenthrine	Talstar Flo	0,625 l	○	○	●	●	Sans délai	
cyhexatin	Nombreuses	300 g m.a.	○	○	●	●	30	
fenpropathrine	Danitol	2 l	○	○	●	●	21	Bonne action de choc. N'utiliser qu'une fois dans l'année en traitement précoce (avant fin juin). Efficace sur Carpocapse, Capua et Mineuse cerclée à 0,1 l/hl.
propargite	Omite 30 WP	4 kg	○	○	●	●	21	Utiliser uniquement sur pommier.

PRODUITS SANS ACTION SUR LES ADULTES - ACTIFS SUR LARVES, CERTAINS SUR ŒUFS

clofentezine	Apollo 50 SC*	0,4 l	●	●	● très jeunes	○	45	S'utilise une fois dans l'année, au printemps, avant le début d'éclosions des œufs d'hiver.
tétrasil	Animert V 101	2 kg	●	●	● jeunes	○	7	Utiliser en début d'éclosion des œufs d'hiver. Faire 2 traitements à 10-15 jours d'intervalle.
chlorofenizon	Trichlorfenson Olatox-Ovitox	1 kg	○	●	●	○	7	
fénizon	Trifenson Ovicide Seppic	1 kg	○	●	●	○	7	Favorise la rugosité sur Golden.
héxythiazox	César*	0,5 kg	○	●	●	○	30	S'utilise une fois dans l'année : - de préférence au printemps (post floraison); - ou en été en début de remontée des populations estivales (si forte population ajouter un adulticide).
tétradifon	Tédion émulsion 8	2 l	○	●	●	○	7	
flubenzimine	Cropotex Karedas	1 kg	○	○	●	○	30	Action progressive. Produit agissant au moment de la mue. S'utilise : - au printemps en cours d'éclosion des œufs d'hiver; - en été en début de remontée des populations estivales associé à un adulticide. Actif sur tavelure.

● actif ● moyennement actif ○ pas actif

* Apollo 50 SC-César : une seule application par an, de l'une ou l'autre de ces spécialités

S.P.V. - Liste arrêtée au 1er janvier 1988